


# 予防接種を計画的に受けましょう

令和6年4月現在

\* 7歳6か月までに行う予防接種は以下のとおりです。スケジュールを立て、体調の良い時に接種しましょう。

※「●歳未満」とは「●歳になる誕生日の前日まで」のことを指します。 接種間隔にご注意ください



予防接種名 (予診票と同じ色で表示)	対象年齢	標準的な 接種期間	回数	接種方法
ロタ	1価 <ロタリックス> 生後6週～24週	1回目の接種は生後14週 6日までにすることが望ましい	2回	4週間以上の間隔をあけて2回接種
	5価 <ロタテック> 生後6週～32週		3回	4週間以上の間隔をあけて3回接種
ヒブ	生後2か月 ～5歳未満  * 接種開始年齢で接種 回数が異なります。	接種 開始 年齢	生後2か月 ～7か月	初回：3回 追加：1回  <初回> 接種後27日以上あけて、次回接種。 * 初回、2回目、3回目は1歳未満に行う。
		生後7か月 ～1歳未満	初回：2回 追加：1回  <追加> 初回接種終了後7か月以上あけて接種。	
		1歳～5歳	1回	
4種混合 ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ	生後2か月 ～7歳6か月未満	生後2か月 ～1歳未満	初回：3回	20日以上間隔をあけて、3回接種。
		初回接種終了後 1年～1年6か月未満	追加：1回	初回（3回）接種終了後6か月以上あけて接種。
小児用肺炎球菌	生後2か月 ～5歳未満  * 接種開始年齢で接種 回数が異なります。	接種 開始 年齢	生後2か月 ～7か月	初回：3回  追加：1回  27日以上あけて、生後1歳未満に3回接種。 * 初回2回目、3回目は2歳未満に行う。 * 初回2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない。
			生後7か月 ～1歳未満	初回：2回 追加：1回  初回接種終了後60日以上あけて接種。 必ず、1歳の誕生日を過ぎてから接種する。
			1歳～2歳未満	2回  60日以上の間隔をあけて2回目を接種。
			2歳～5歳未満	1回
B型肝炎	生後2か月 ～1歳未満	生後2か月 ～9か月未満	第1回目 第2回目 第3回目	27日以上（4週間以上）あけて2回目を接種。  第1回目から、139日以上（20週間以上）あけて接種。
BCG	1歳未満	生後5か月～8か月未満	1回	
水痘 (水ぼうそう)	1歳～3歳未満	1回目 1歳～1歳3か月未満 2回目 1回目終了後6か月～1年	2回	3か月以上間隔をあけて、2回目を接種。
麻しん風しん 混合ワクチン (MR)	1期	1歳～2歳未満	1回	
	2期	小学校就学前の 1年間（年長児）	1回	年長児の学年 （*年長児となる年の年度初めに予診票を送っています。）
日本脳炎	1期	生後6か月 ～7歳6か月未満	初回：2回 追加：1回	6日以上あけて2回目を接種。 （*3歳児になる年の年度初めに予診票を送っています。）  1期初回終了後6か月以上あけて1回接種。

予防接種名 (予診票と同じ色で表示)	対象年齢	標準的な 接種期間	回数	接種方法
<b>5種混合</b> ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ ヒブ	<b>生後2か月            ~7歳6か月未満</b>	<b>生後2か月            ~7か月未満</b>	初回：3回	20日以上（56日間隔をあけて、3回接種。）
		<b>初回接種終了後            6か月~1年6か月未満</b>	追加：1回	初回（3回）接種終了後6か月以上あけて接種。

\*上記の**5種混合**は、4種混合及びヒブのワクチン接種に代わり、R6年4月1日から接種開始します。  
ただし、当面の間は4種混合及びヒブのワクチン接種もできます。