


予防接種を計画的に受けましょう

令和2年4月現在

* 7歳6か月までに行う予防接種は以下のとおりです。スケジュールを立て、体調の良い時に接種しましょう。



予防接種名 (予診票と同じ色で表示)	対象年齢	標準的な 接種期間	回数	接種方法	
ヒブ	生後2か月 ～5歳未満 *接種開始年齢で接種 回数が異なります。	接種 開始 年齢	生後2か月 ～7か月	初回：3回 追加：1回	<初回> 接種後27日以上あけて、次回接種。 *初回、2回目、3回目は1歳未満に行う。 <追加> 初回接種終了後7か月以上あけて接種。
		生後7か月 ～1歳未満	初回：2回 追加：1回		
		1歳～5歳	1回		
小児用肺炎球菌	生後2か月 ～5歳未満 *接種開始年齢で接種 回数が異なります。	接種 開始 年齢	生後2か月 ～7か月	初回：3回 追加：1回	27日以上あけて、生後1歳未満に3回接種。 *初回2回目、3回目は2歳未満に行う。 *初回2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない。 初回接種終了後60日以上あけて接種。 必ず、1歳の誕生日を過ぎてから接種する。
			生後7か月 ～1歳未満	初回：2回 追加：1回	27日以上あけて2回目を接種。 *初回2回目は2歳未満に行う。 初回接種終了後60日以上あけて接種。 必ず、1歳の誕生日を過ぎてから接種する。
			1歳～2歳未満	2回	60日以上の間隔をあけて2回目を接種。
			2歳～5歳未満	1回	
B型肝炎	生後2か月 ～1歳未満	生後2か月 ～9か月に至るまで	第1回目 ----- 第2回目 ----- 第3回目	27日以上（4週間以上）あけて2回目を接種。 第1回目から、139日以上（20週間以上）あけて接種。	
4種混合 ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ	生後3か月 ～7歳6か月未満	生後3か月 ～1歳未満	初回：3回	20日以上間隔をあけて、3回接種。	
		初回接種終了後 1年～1年6か月未満	追加：1回	初回（3回）接種終了後6か月以上あけて接種。	
BCG	1歳未満	生後5か月～8か月	1回		
水痘 (水ぼうそう)	1歳～3歳未満	1回目 1歳～1歳3か月未満 ----- 2回目 1回目終了後6か月～1年	2回	3か月以上間隔をあけて、2回目を接種。	
麻しん風しん 混合ワクチン (MR)	1期	1歳～2歳未満	1歳になったらできるだけ早いうちに	1回	
	2期	小学校就学前の 1年間（年長児）		1回	年長児の学年（年長児となる年の年度初めに予診票を送っています。）
日本脳炎	1期	生後6か月 ～7歳6か月未満	3歳に達した時から4歳に達するまでの期間	初回：2回	6日以上あけて2回目を接種。 (3歳児になる年の年度初めに予診票を送っています。)
		4歳に達した時から5歳に達するまでの期間	追加：1回	1期初回終了後6か月以上あけて1回接種。	



※「●歳未満」とは「●歳になる誕生日の前日まで」のことを指します。

不明なことなどありましたら、下記までお問い合わせください。

身延町役場 子育て支援課 母子保健担当（保健師）
電話 0556(20)4580



接種間隔にご注意ください！！